

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Н.А. ВЛАСОВ

09.08.2016



## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Капель Фолайн® для лечения и профилактики  
аракно-энтомозов и профилактики дирофилияриоза у собак и кошек

(организация-разработчик: ООО НБЦ «Фармбиомед»,  
117192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 12, к. 1, к.п.)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Капли Фолайн® (Foline).  
Международное непатентованное наименование: аверсектин и фипронил.
2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.  
Капли Фолайн® в качестве действующих веществ содержат аверсектин С<sub>1</sub> – 4 мг/мл; фипронил – 100 мг/мл, а также вспомогательные вещества: спирт этиловый – 15% и полиэтиленгликоль-400 до 100%.
3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до желтого цвета.
- Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 2 года со дня производства.  
Запрещается применение Капель Фолайн® по истечении срока годности.
4. Выпускают Капли Фолайн®, расфасованными по 0,5 и 1,5 мл в ампулы полимерные, упакованные по 1, 2 или 3 ампулы в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.
5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 30°C.
6. Капли Фолайн® следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

### II. Фармакологические свойства

9. Капли Фолайн® относятся к группе комбинированных противопаразитарных лекарственных препаратов контактного и системного действия.
10. Капли Фолайн® эффективны против личиночных и половозрелых фаз развития вшей (Linognathus setosus), блох (Ctenocephalides felis, Ctenocephalus canis), власоедов (Trichodectes canis, Felicola subrostratus), клещей отодектосов (Otodectes cunotis,) и иксодовых клещей (Ixodes spp., Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Amblyomma spp.), а также личинок нематоды Dirofilaria spp., паразитирующих у собак и кошек.

Механизм действия аверсектина С<sub>1</sub>, заключается в его воздействии на величину тока ионов хлора через мембранны нервных и мышечных клеток паразита. Основной мишенью являются глютаматчувствительные хлорные каналы, а также рецепторы гам-

ма-аминомасляной кислоты. Изменение тока ионов хлора нарушает проведение нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели паразита. Аверсектин С<sub>1</sub> быстро всасывается и распределяется в органах и тканях животного. Максимальная концентрация аверсектина С<sub>1</sub> в крови достигается на 3 сутки после обработки и постепенно снижается к 21 суткам, обеспечивая высокую и устойчивую противопаразитарную эффективность. Аверсектин С<sub>1</sub> выводится из организма преимущественно с фекалиями в основном в неизмененном виде и частично с мочой.

Механизм действия фипронила заключается в блокировании ГАМК-зависимых хлорных каналов, что приводит к перевозбуждению нервной системы и гибели эктопаразитов. Фипронил не является препаратом системного действия (не попадает в кровь), в течение 24 часов постепенно распределяется по всей поверхности тела, накапливается в эпидермисе и сальных железах животного и оказывает контактное инсектоакарицидное действие на эктопаразитов. Депонирование лекарственного препарата в сальных железах создаёт «эффект резервуара» и обуславливает длительность его воздействия.

Капли Фолайн® по степени воздействия на организм относятся к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), оказывают быстропроходящее раздражающее действие на слизистую оболочку глаза, в рекомендуемых дозах лекарственный препарат не оказывает кожно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

### III. Порядок применения

11. Капли Фолайн® применяют для лечения и профилактики энтомозов, вызванных блохами, власоедами и вшами, отодектоза, инвазий, вызванных иксодовыми клещами, а также для профилактики дирофиляриоза.

12. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата (в том числе в анамнезе).

Ввиду выраженной породной чувствительности к авермектинаам лекарственный препарат следует применять с осторожностью собакам породы колли, бобтейл и шелти.

Ослабленным и старым животным Капли Фолайн® применяют под контролем лечащего ветеринарного врача.

13. Обработку животных проводят на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Перед применением у ампулы отламывают кончик, раздвигают шерсть в области холки (между лопатками) и, нажимая на ампулу, полностью выдавливают содержимое на кожу в одну или несколько точек. После нанесения лекарственный препарат распределяется по всему кожному покрову животного в течение 24 часов. В зависимости от вида и массы животного используют ампулы различного объема:

Вид животного	Объем используемой ампулы (мл)
Собаки:	
от 2 до 10кг	0,5 (1 ампула)
от 10 до 20 кг	1,5 (1 ампула)
от 20 до 40 кг	3,0 (2 ампулы по 1,5 мл)
более 40 кг	4,5 (3 ампулы по 1,5 мл)
Кошки:	0,5 (1 ампула)

Повторные обработки животных в целях профилактики энтомозов проводят 1 раз в квартал, против нападения иксодовых клещей в сезон их активности с интервалом 3-4 недели.

С целью профилактики дирофиляриоза в неблагополучных по заболеванию регионах лекарственный препарат применяют в весенне-летне-осенний период: перед началом лета комаров (переносчиков возбудителя *D. Immitis* и *D. repens*) однократно, затем один раз в 3-4 недели и последний раз за 3 недели до завершения лета насекомых. Перед обработкой, следует проконсультироваться с ветеринарным врачом. При применении лекарственного препарата животным с большим количеством микрофильярий могут возникнуть осложнения.

Капли Фолайн применяют для лечения отодектоза (ушной чесотки). С этой целью закапывают в каждое ухо по 2-4 капли. Обязательно вводят в оба уха, не зависимо от локализации заболевания. Для равномерного распределения лекарственного препарата ушную раковину складывают пополам и слегка массируют ее основание, остаток наносят на кожу между лопаток (однократная обработка).

Не следует допускать попадания Капель Фолайн<sup>®</sup> на слизистую оболочку глаз.

Не рекомендуется гулять с животными, в зоне возможного присутствия клещей в течение 24 часов с момента обработки лекарственным препаратом Капли Фолайн<sup>®</sup>.

Не рекомендуется купать или мыть животных в течение 48 часов после обработки лекарственным препаратом.

14. При значительной передозировке лекарственного препарата у животных может наблюдаться угнетенное состояние, избыточное слюноотделение, рвота. В этом случае лекарственный препарат смывают водой с моющим средством. Специфические средства детоксикации отсутствуют, применяют общие меры, направленные на выведение лекарственного препарата из организма.

15. Особеностей действия лекарственного препарата при его первом применении или отмене не выявлено.

16. Щенкам и котятам в возрасте до 7 недель, а так же беременным и кормящим самкам Капли Фолайн<sup>®</sup> применяют под контролем лечащего ветеринарного врача.

17. Следует избегать нарушений схемы применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной обработки применение лекарственного препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

18. Побочных явлений и осложнений при применении Капель Фолайн<sup>®</sup> в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций препарат следует смыть водой с моющим средством и при необходимости провести десенсибилизирующую терапию.

19. Капли Фолайн<sup>®</sup> не следует применять совместно с авермектинсодержащими и другими противопаразитарными лекарственными препаратами для обработки животных.

20. Капли Фолайн<sup>®</sup> не предназначены для обработки продуктивных животных.

#### IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Каплями Фолайн<sup>®</sup> следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу.

22. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Каплями Фолайн<sup>®</sup>. Обработку животных следует проводить в резиновых перчатках. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой во-

дой с мылом. В течение 48 часов после обработки животных не следует гладить и подпускать к маленьким детям.

Запрещается использовать пустые емкости из-под лекарственного препарата для бытовых целей. Их помещают в полиэтиленовый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

23. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом, при попадании в глаза – промыть их в течение нескольких минут проточной водой. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению лекарственного препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «Фармбиомедсервис», 129226,  
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная,  
дом 12а, к.4.

ООО «Фармбиомедсервис», 129226,  
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом  
12а, к.4

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Капель Фолайн®, утвержденная Россельхознадзором 06.08.2014 г.

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-5714-2150 N 17ВР-3-5.14/03043